

暴斃少女濫藥量足死**10**次 旺角蒲**D** 1小時內索**K**服近**10**粒搖頭丸 (明報) 02月 08日 星期四 05:10AM

【明報專訊】13歲中一女學生去年7月與友人到旺角一間的士高消遣，吸食過量「**K**仔」（氯胺酮）及安非他命（又稱搖頭丸或狂喜）後倒斃街頭。死因庭昨就案件召開聆訊，負責政府化驗師指出，相信少

女死前曾服用最少8至9粒搖頭丸，分量超出可致死亡分量的9至10倍。而同行友人亦指出，相信少 廣告
女到場一小時內，曾分別吸食**K**仔及搖頭丸。

據陪同少女卓慧妍一同到的士高的證人張妙珍供稱，去年7月25日晚上，與認識了數天的卓一同到旺角的輝煌星夜總會消遣。「到場10多分鐘後，慧妍問我是否想食搖頭丸。不久後我看見她被一群男仔圍住，手背上亦有一吋長的**K**仔（粉）。」

死者被人圍住 手背有一吋**K**仔

張續指出，到凌晨4時，她與卓離開的士高，由於卓當時步履不穩，她與卓另一男性友人把她攙扶到附近的公園休息。卓其後表示很辛苦及不能呼吸。張買了水及檸檬茶給卓，但卓無法自行飲用，她遂餵卓喝下飲料，但卓把飲料全吐出來。兩人在公園逗留到凌晨6時半，張拍打卓的臉部，發現卓已毫無反應，仔細查看下，發現卓的手腳冰冷，亦沒有呼吸及心跳，張於是報警。

驗屍報告指卓的直接死因是服用過量狂喜（安非他命）而引致不良反應。政府化驗師譚偉明昨指出，根據卓的化驗報告，卓每毫升血液內含有3.8微克安非他命，從此可推論她死前的一段短時間，曾服用最少8至9粒搖頭丸。參考外國同類個案，人體內每毫升血液含有0.4微克安非他命已可導致死亡，而卓服用的分量已超出可致死亡分量的9至10倍。

同校生警惕 濫藥大減

卓生前就讀的屯門三聖邨鐘聲慈善社胡陳金枝中學，該校校長林達仁昨透露，事件後校內學生吸食毒品的情況已有改善。「學生經此事後已有所警惕，校內社工亦表示，事發後再沒有收到學生吸食毒品的個案，相信事件令學生明白，吸食毒品真的可以致命。」

事發後數日，警方在油尖旺區搜查多間娛樂場所，包括輝煌星夜總會，警方並於該場內拘捕3名涉嫌藏毒的男女，整個行動中拘捕70人。

【案件編號：CDDI 923/06】